



BOAR BETTER®

Zawiera feromony knura stymulujące odruchy rujowe u loch. Spray BOARBETTER służy do wykrywania rui u hodowlanych samic świń. Produkt ten opracowano w celu naśladowania trzech feromonów występujących naturalnie w ślinie knurów (chinolina, androstenon, androstenol). Zawiera roztwór trzech syntetycznych cząsteczek feromonów połączonych w unikalnej kombinacji, którą określa się jako Boar Saliva Analogue (BSA) – odpowiednik śliny knura (BSA jest substancją czynną BOARBETTER) i która jest przedmiotem zgłoszenia patentowego albo patentu. Nie zawiera produktów pochodzenia zwierzęcego. Feromony knura odpowiadają za ‘zapach knura’, więc produkt ten może zredukować potrzebę utrzymywania żywych knurów pomagających w wykrywaniu loch w rui. Badania laboratoryjne i terenowe potwierdziły, że połączenie składników BSA daje efekt synergistyczny. Ta innowacyjna kompozycja może zwiększać odruchy rozrodcze hodowlanych samic i pomagając osiągnąć maksymalną wydajność rozrodczą. SKŁAD: Feromony knura BSA* chinolina, androstenon, adrostenol0.0020%, substancje pomocniczedo 100%. *Boar Saliva Analogue (odpowiednik śliny knura) – produkt objęty jest ochroną patentową przez jeden lub więcej patentów lub wniosków patentowych. Status sytuacji patentowej można sprawdzić na stronie <https://www.vetoquinol.com/boarbetter/ip> . ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY: W przypadku inhalacji, osobę należy wyprowadzić na świeże powietrze. Jeśli to konieczne, zastosować sztuczne oddychanie i wezwać lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą, umyć dokładnie wodą z mydłem. W przypadku kontaktu z oczami, należy je przepłukać ciepłą wodą przez rozchylenie powiek palcami, przez co najmniej 15 minut. Wezwać lekarza jeśli podrażnienie się utrzymuje. W przypadku spożycia, jeśli osoba jest przytomna, przepłukać usta wodą a następnie potem wypić świeżą wodę. Skontaktować się z lekarzem i pokazać ulotkę. Usuwanie odpadów Usuwać zgodnie z przepisami. Skontaktować się z licencjonowaną firmą odbierającą odpady. Nie wyrzucać do kanalizacji i do środowiska. Rozpryski pokryć absorbentem, który należy zebrać po osuszeniu. Splukać miejsce rozlewu. Do utylizacji przechowywać w zamkniętych pojemnikach. SPOSÓB STOSOWANIA BOARBETTER może być stosowany bez knura, lub w połączeniu z knurem w celu zwiększenia ekspozycji na feromony. Dla osiągnięcia dobrych wyników należy zacząć stosować BOARBETTER od początku rui, zwykle od 3-4 dnia po odsadzeniu. Przed sprawdzeniem objawów rujowych rozpylić 4 ml BOARBETTER w jednym podaniu bezpośrednio na tarczę ryjową (kierując bezpośrednio w nozdrza). Zastosować ucisk na grzbiet, aby sprawdzić występowanie odruchu tolerancji. W przypadku stosowania tradycyjnej sztucznej inseminacji pokryć samice, jeśli wykazują odruch tolerancji, zgodnie z protokołem przyjętym na fermie. W przypadku stosowania pozaszyjkowej inseminacji (PCAI) loch, należy kryć 30-60 minut później, zgodnie z fermowym protokołem rozrodu PCAI. Jeśli locha nie jest w rui, postępowanie należy powtarzać codziennie aż do wystąpienia rui, zgodnie z protokołem przyjętym na fermie. Środki ostrożności: Należy stosować ochronne rękawice, ubranie ochronne, osłonę twarzy i oczu. Po każdym użyciu umyć ręce. PO KONTAKCIE ZE SKÓRA (lub włosami): usunąć/zdjąć natychmiast całą zanieczyszczoną odzież. Splukać skórę wodą/prysznicem. Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła i światła. Nie zamrażać. 461613 0620 D Wytwórca: VETOQUINOL S.A., Magny-Vernois, 70200 LURE, FRANCE.