**Milkodog**
**Preparat mlekozastępczy**

## ZASTOSOWANIE

Karma pełnoporcjowa dostarczająca nowo narodzonym szczeniętom niezbędnych składników matczynego mleka. Jest preparatem mlekozastępczym dla osieroconych szczeniąt i może być stosowany jako karma uzupełniająca w przypadku większości miotów lub za małej ilości mleka. Może być podawany rozpuszczony w wodzie lub jako mleko w proszku wymieszane ze zwykłą karmą. Wysokiej jakości składniki, wzbogacone witaminami i oligoelementami są łatwostrawne i wspomagają prawidłowy wzrost.

## PODAWANIE

Przygotowanie: W załączonej butelce: napełnić butelkę mlekiem w proszku do poziomu zaznaczonego jako POWDER. Dolać ciepłej wody do poziomu zaznaczonego jako WATER i nałożyć smoczek na butelkę. Wstrząsnąć, zapewnić dokładne wymieszanie i dolać wody do linii WATER. W innych pojemnikach: rozpuścić 1 objętość mleka w proszku w 2 objętościach ciepłej wody. Wstrząsnąć, zapewnić dokładne wymieszanie.

## STOSOWANIE

Karmić mlekiem o temperaturze ciała (37$^{o}$ C). W smoczku zrobić dziurkę. Karmić regularnie. Mieszaninę podawać zgodnie z potrzebami (szczenięta same regulują potrzeby żywieniowe), mając na uwadze zalecane podawanie:

| Wiek | 1 tydzień | 2 tydzień | 3 tydzień | 4 tydzień | 5 tydzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba karmień w ciągu dnia | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| Średnia dzienna objętość (ml/100g masy ciała) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Zakres dziennej objętości (ml/100g masy ciała) | 18-28 | 18-28 | 18-28 | 18-28 | 18-28 |

Szczenięta powinny codziennie przyrastać. Codzienne ważenie pozwala dostosować objętość karmienia. Od 4 tygodnia szczenięta powinny stopniowo być przyzwyczajane do karmienia stałą karmą. Z powodu zawartych pierwiastków śladowych i witamin z określonym maksymalnym dopuszczalnym spożyciem nie podawać więcej niż 350g proszku/szczenię/dzień.
Zalecany czas stosowania: stosować gdy to niezbędne do czasu gdy szczenię będzie w stanie otrzymać odpowiednią ilość matczynego mleka lub będzie w pełni przygotowane do karmienia karmą stałą.

## PRZECHOWYWANIE

Przed rozpuszczeniem w wodzie przechowywać w temperaturze pokojowej i chronić przed światłem. Zamykać puszkę plastikowym wieczkiem. Stosować niezwłocznie po otwarciu. Po przygotowaniu przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu 24 godzin. Przechowywać w miejscu niewidocznym i poza zasięgiem dzieci.

## SKŁAD

Mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze, zboża, ekstrakt z białek roślinnych, związki mineralne. Dodatki/kg: witaminy i pro-witaminy: wit. A 25000IU, wit. D3 1000IU, wit. E 160mg, wit. B1 22mg, wit. B2 34mg, wit. B6 16mg, wit B12 0,3mg, wit. K 0,8mg, wit. C 10mg, tauryna 2000mg; mieszanki pierwiastków śladowych: cynk 180mg, żelazo 100mg, mangan 60mg, miedź 10mg, jod 3mg, selen 0,3mg, przeciwutleniacze: BHT 62ppm, BHA 10ppm; spoiwa i środki przeciwzbrylające, substancje aromatyzujące, emulgatory. Składniki analityczne: białko surowe 28%, tłuszcz surowy 32%, popiół surowy 7,6%; wapń 1,1%, fosfor 0,8%, sód 0,48%, włókno surowe 0,2%

Masa netto:
350 g

Produkcja:Vétoquinol FR 29 156 700

Pakowanie: Vétoquinol SA, FR 69 243 018
Dystrybucja I informacja: Vetoquinol Biowet Sp. Z o.o., Gorzów Wlkp., www.vetoquinol.pl